


前下大腦動脈枝中風

Anterior Inferior Cerebellar Artery Stroke

衛教單



作者: Laura O. Morris, PT, NCS



我曾經中風，但為什麼我有不尋常的症狀？

中風多會引起半邊身體無力，然而如果中風的位置在小腦，症狀就會有明顯不同。前下大腦動脈支供應血液到小腦。小腦掌管平衡、協調性、臉和身體的感覺、臉部的動作感、身體姿勢和中線感、聽覺和眼睛動作的協調。

前下大腦動脈支中風會引起：暈眩、噁心、失去平衡且有被拉往一側的感覺、臉部肌肉無力且一邊會麻，身體一側的感覺降低、聽力受損或耳鳴、走路困難。可能有視力模糊而且協調能力也可能受損。

我該如何才能復元的更好？

治療會依據您的症狀和其嚴重度來決定。假如您的聽力有問題，您可能必須去看有聽力專科的醫師和聽語學家。假如有吞燕問題，您可能需要喉部專科的醫師和語言治療師來協助您以確保你安全的吃和喝。假如您的視力受損，有神經疾病專長的眼科醫師可以幫助您被中風影響的眼睛。

假如您的平衡受到影響，物理治療能幫助您走路安全。有時可能需要助行器(walker)或柺杖。物理治療也會著重在改善您身體的空間感和減少您被拉往一側的感覺。

假如您會暈眩，物理治療師會幫助您了解這些症狀和減輕這些症狀。逐漸地增加您的運動耐受度將會幫助您的行動力更好。當您的轉在轉動使您的眼睛專注在一個地方可以幫助您減轉暈眩。您的治療師也會幫助您了解前庭(vestibular)，內耳系統的功能。這些知識能幫助您預測怎樣的活動會增加您的症狀或您的症狀會被激發。最後，您的個人治療目標也會被列入考量之中。



1111 North Fairfax Street
Alexandria, VA 22314-1488

Phone: 800-999-2782,

Ext 3237

Fax: 703-706-8578

Email: neuropt@apta.org

www.neuropt.org

翻譯：林佳政 物理治療師

Translate by: Chia-Cheng Lin, PT, MS